关东地区主要港口周边的放射线量监测结果

茨城县网站(港湾放射线信息)
http://www.pref.ibaraki.jp/juyojoho/index.html

千叶县网站(港湾放射线信息)
http://www.pref.chiba.lg.jp/kouwan/houshasen/h23sokuteikekka.html

东京都网站(港湾放射线信息)
http://www.kouwan.metro.tokyo.jp/jishin_kouwankyoku_oshirase/

川崎市网站(港湾放射线信息)
自开始测定以来，一次都未检测出超过限界的数值，故暂停测定。

横滨市网站(港湾放射线信息)
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/yokohamako/kkihon/kikikanri/sokuteijoukyou.html

国际战略港口
国际基地港口
重要港口
国际机场

・东京电力的网站上按照 1 nGy/h≒ 1 nSv/h进行换算。
・1nSv/h＝0.001μSv/h



茨城县 日立市 久慈	0.046μSv/h 2024. 2.29. 10:00

摘自茨城县环境放监视中心网站
http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/

茨城县 常陆那珂市 阿字浦	0.051μSv/h 2024. 2.29. 10:00

摘自茨城县环境放射线监视中心网站
http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/

茨城县 大洗町 矶滨	0.042μSv/h 2024. 2.29[. 10:00

摘自茨城县环境放射线监视中心网站
http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/

茨城县 神栖市	0.051μSv/h 2023. 3.23 10:00

摘自茨城县环境放射线监视中心网站
http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/

千叶县 市原市	0.025μSv/h 2024.2.29. 10:00

摘自千叶县环境研究中心网站 http://www.pref.chiba.lg.jp/

东京都 新宿区	0.036μGy/h 2024. 2.29 9时至10的平均值

摘自东京都健康安全中心网站 http://www.tokyo-eiken.go.jp/

神奈川县 川崎市 川崎区	暂停测定

神奈川县横滨市	0.028μGy/h 2024. 2.29. 10:00

摘自横滨市网站 http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo

神奈川县 横须贺市	0.031μSv/h 2024. 2.29. 10:00

摘自神奈川县安全防灾局网站 http://www.atom.pref.kanagawa.jp/

试样采集地点	2024. 2. 29. 9:40		
	碘 I-131	铯 Cs-134	铯 Cs-137
东京湾浦贺水道航路附近	未检出 低于5Bq／kg	未检出 低于5Bq／kg	未检出 低于5Bq／kg

<参　考>
●日本原子能安全委员会公布的有关饮食物摄取限制的指标值
・放射性碘（饮用水）　300Bq(贝克勒尔)／水1kg
●食品卫生法上的标准值(从2013年4月1日起施行)：
・饮用水　10Bq(贝克勒尔)/水1kg
※Bq(贝克勒尔)是指放射性物质释放出的放射能强度。
※对象核种（铯134、铯137、锶90、钚、钌106）的合计。

【测定方法】
试验方法：根据《紧急时食品的放射能检测手册》（2002年3月：日本厚生劳动省医药局食品保健部监视安全课）”
利用锗半导体检测器伽玛射线光谱进行核分析
试验项目：放射性碘及放射性铯