

关东地区主要港口周边的放射线量监测结果

茨城县网站(港湾放射线信息)
<http://www.pref.ibaraki.jp/juyojocho/index.html>

千叶县网站(港湾放射线信息)
<http://www.pref.chiba.lg.jp/kouwan/houshasen/h23sokuteikekk.html>

东京都网站(港湾放射线信息)
http://www.kouwan.metro.tokyo.jp/jishin_kouwankyoku_oshirase/

川崎市网站(港湾放射线信息)
自开始测定以来,一次都未检测出超过限界的数值,故暂停测定。

横滨市网站(港湾放射线信息)
<https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/yokohamako/kikihon/kikikanri/sokuteijoukyou.html>

- 国际战略港口
- 国际基地港口
- 重要港口
- 国际机场

• 东京电力的网站上按照 $1 \text{ nGy/h} \approx 1 \text{ nSv/h}$ 进行换算。
• $1 \text{ nSv/h} = 0.001 \mu\text{Sv/h}$

茨城县
日立市
久慈
0.046 $\mu\text{Sv/h}$
2026. 8.7. 9:56

摘自茨城县环境放射线监视中心网站
<http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/>

茨城县
常陆那珂市
阿字浦
0.051 $\mu\text{Sv/h}$
2026. 8.7. 9:56

摘自茨城县环境放射线监视中心网站
<http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/>

茨城县
大洗町
矶滨
0.043 $\mu\text{Sv/h}$
2026. 8.7. 9:56

摘自茨城县环境放射线监视中心网站
<http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/>

茨城县
神栖市
0.045 $\mu\text{Sv/h}$
2023. 3.23 10:00

摘自茨城县环境放射线监视中心网站
<http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/>

千叶县 市原市
0.025 $\mu\text{Sv/h}$
2026. 8.7. 9:56

摘自千叶县环境研究中心网站 <http://www.pref.chiba.lg.jp/>

东京都
新宿区
0.036 $\mu\text{Gy/h}$
2026. 8.7. 9时至10时的平均值

摘自东京都健康安全中心网站 <http://www.tokyo-eiken.go.jp/>

神奈川県
川崎市 川崎区
暂停测定

神奈川県横浜市
0.042 $\mu\text{Gy/h}$
2026. 8.7. 9:56

摘自横浜市网站 <http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo>

神奈川県
横须贺市
0.028 $\mu\text{Sv/h}$
2026. 8.7. 9:56

摘自神奈川県安全防災局网站 <http://www.atom.pref.kanagawa.jp/>



试样采集地点	2026. 8.7. 9:56		
	碘 I-131	铯 Cs-134	铯 Cs-137
东京湾浦贺水道 航路附近	未检出 低于5Bq/kg	未检出 低于5Bq/kg	未检出 低于5Bq/kg

<参 考>
●日本原子能安全委员会公布的有关饮食物摄取限制的指标值
・放射性碘(饮用水) 300Bq(贝克勒尔)/水1kg
●食品卫生法上的标准值(从2013年4月1日起施行):
・饮用水 10Bq(贝克勒尔)/水1kg
※Bq(贝克勒尔)是指放射性物质释放出的放射能强度。
※对象核种(铯134、铯137、锶90、钚、钍106)的合计。

【测定方法】
试验方法: 根据《紧急时食品的放射能检测手册》(2002年3月: 日本厚生劳动省医药局食品保健部监视安全课)
利用锗半导体检测器伽玛射线光谱进行核分析
试验项目: 放射性碘及放射性铯